


# С «ГепталНАН» И ПЕЧЕНЬ ЗДОРОВА, И НАСТРОЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

Производитель — государственное предприятие «Академфарм».



**Х**ронические заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) зачастую становятся почвой для депрессии, которую подпитывают постоянные мысли о тяжести недуга. Гнетущее настроение, в свою очередь, усугубляет состояние. Именно поэтому у многих пациентов, даже несмотря на прием высокоэффективных препаратов, выздоровление затягивается. Возникает порочный круг, разорвать который можно, только если вместе с терапией основной патологии взяться еще и за лечение депрессии.

Однако здесь возникает проблема: многие антидепрессанты негативно влияют на печень.

Если антидепрессант противопоказан при заболеваниях печени, в том числе при внутрипеченочном холестазе, то в такой ситуации можно воспользоваться препаратом «ГепталНАН» — это

Произведено по стандартам GMP из высококачественной европейской субстанции ademetionine (Omnibios s.r.l., Италия) на производственной базе Национальной академии наук Республики Беларусь).



гепатопротектор и антидепрессант в одном лице. Секрет эффективности — в действующем веществе адеметионине. Эта аминокислота вырабатывается в организме человека и участвует в синтезе биологически активных веществ и фосфолипидов, обладает регенерирующими и детоксикационными свойствами, расщепляет жиры и способствует выведению их из печени, а также благотворно сказывается на настроении.

При некоторых заболеваниях, негативном воздействии повреждающих факторов (алкоголь, некоторые медикаменты) возникает дефицит адеметионина. «ГепталНАН» как раз-таки направлен на восполнение нехватки этого вещества, стимуляцию его выработки клетками печени и мозга.

В первую очередь препарат рекомендуется применять страдающим внутривеночным холестазом. Эта патология характерна, например, при циррозе печени. Повреждаются клетки печени (гепатоциты) и желчные каналы, что приводит к нарушению оттока желчи по желчным протокам: поступление секрета в двенадцатиперстную кишку уменьшается, зато он накапливается в клетках печени и желчевыводящих путях. Постепенно в крови растет концентрация желчных кислот, отравляющих организм. Беспокоят кожный зуд (основное клиническое

проявление недуга), нарушения пищеварения (метеоризм, снижение аппетита, непереносимость жирной пищи, тошнота). Поздний симптом холестаза — желтуха.

Адеметионин нормализует метаболические процессы в клетках печени, способствует их восстановлению и оттоку желчи. При этом защищает от токсического воздействия желчных кислот.

Последние научные данные указывают на то, что гепатопротекторный и желчегонный эффект сохраняется еще в течение 3 месяцев после того, как пациент прошел курс терапии.

#### **Дозировка при лечении внутривеночного холестаза**

##### *Начальная терапия*

Рекомендуемая доза — 10–25 мг/кг/сутки. Обычная начальная доза — 800 мг/сутки (2 таблетки), суммарная суточная не должна превышать 1 600 мг (4 таблетки).

##### *Поддерживающая терапия*

Суточная доза — 800–1 600 мг (2–4 таблетки).

«ГепталНАН» может использоваться при лечении пациентов с симптомами депрессии.

У некоторых больных с хроническими заболеваниями ЖКТ на фоне основной патологии развивается соматическая депрессия, которая маскируется под нарушения работы ЖКТ. Ее сложно распознать, потому что на первый план выходят физические ощущения:

тошнота, боли в животе. При этом типичные симптомы депрессии выражены слабо. Человек лечит основное заболевание, не подозревая, что истинная причина плохого самочувствия именно в депрессии. Неудивительно, что успеха от такого лечения нет.

#### **Дозировка при лечении пациентов с симптомами депрессии**

##### *Начальная терапия*

Рекомендуемая суточная доза — 800–1 200 мг (2–3 таблетки).

##### *Поддерживающая терапия*

Рекомендуемая суточная доза — 800–1 200 мг (2–3 таблетки).

«ГепталНАН» отпускается по рецепту врача. Длительность терапии зависит от тяжести и течения заболевания и определяется индивидуально.

Препарат противопоказан при гиперчувствительности к адеметионину или любому другому компоненту; лицам до 18 лет; пациентам с генетическими нарушениями, влияющими на цикл метионина и/или вызывающих гомоцистеинурию и/или гипергомоцистеинемию (например, дефицит цистатионин бета-синтетазы, нарушение метаболизма витамина B<sub>12</sub>).



**ТЕЛ./ФАКС (8-017) 268-63-64.**

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО.**

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
С ИНСТРУКЦИЕЙ ИЛИ  
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.